



1. NOME E MARCA COMERCIAL : FORMICIDA 7 BELO GEL

2. IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA:
Inseticida

3. DESTINO / APLICAÇÃO:
Venda Livre.

4. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE : 3.2699.0018.0011

5. DESCRIÇÃO DO ATIVO:

- **SULFLURAMIDA**

- O produto é apresentado sob a forma de gel - contendo 0,2% p/p, de ingrediente ativo.
- Nome comum: **SULFLURAMIDA**
- Nome químico (IUPAC): N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide

Fórmula Bruta: C₁₀ H₆ F₁₇ NO₂S **Número CAS:** 4151-50-2

6. DESCRIÇÃO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA:

- Primária: seringas plásticas com 10 gramas cada;
- Secundária: Cartucho papel cartão .

7. CLASSE, SEGUNDO A ATIVIDADE CONTRA A PRAGA ALVO, GRUPO QUÍMICO E MODO DE AÇÃO:

Inseticida gel contra formigas doces (por ex.: *Monomorium floricola*), para uso doméstico do grupo químico Sulfonamida Fluoroalifática, com ação de contato e ingestão. Sulfluramida é um inseticida de ação lenta, mata insetos pelo rompimento do fluxo normal de prótons, usados por suas células de armazenamento de energia (mitocôndrias), para criar o ATP. Uma vez sendo as Mitocôndrias rompidas e a energia reservada consumida, os insetos morrem.

8. MODO E RESTRIÇÕES DE USO:

Modo de Usar: retirar a tampa protetora que cobre o bico de aplicação. Pressionar o êmbolo até que o gel comece a sair. Aplicar pequenos filetes de 01 a 02 cm de comprimento, preferencialmente ao lado dos carreiros ou caminho das formigas. Quando a infestação for maior, aumente o número de pontos de aplicação. Não interfira, mesmo quando for verificado aumento do número de formigas nos pontos tratados, pois quanto maior o número de formigas que se alimentam da isca, melhor será o resultado. Com o tempo, a infestação nos pontos tratados diminuirá, indicando a morte das formigas. Reponha o produto, todas as vezes que observar atividade das formigas ou houver consumo do Formicida 7 Belo Gel. Para não interferir na atividade da isca, não jogue água, produtos de limpeza ou outros inseticidas sobre o gel, evitando também, fumar nos locais



próximos. Aplique preferencialmente em superfícies planas. Após o uso de todo o conteúdo da seringa, o êmbolo travará automaticamente, como segurança para não reutilização

9. INDICAÇÃO DAS PRAGAS CONTRA AS QUAIS É RECOMENDADO:

FORMICIDA 7 BELO GEL é uma isca na forma de gel pronto uso à base de Sulfluramida 0,2%, indicado no controle de formigas doceiras, por ex.: *Monomorium floricola*, para uso doméstico.

10. MÉTODO DE DESATIVAÇÃO E DESCARTE DO PRODUTO E DA EMBALAGEM DE MODO A IMPEDIR QUE OS RESÍDUOS REMANESCENTES PROVOQUEM RISCO À SAÚDE E MEIO AMBIENTE:

Não se aplica, a embalagem vazia e travada pode ser descartada em lixo comum por não oferecer riscos às pessoas e ao ambiente

11. RESUMO DAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS RELATIVAS AOS CUIDADOS COM A SAÚDE HUMANA COM DESTAQUE PARA OS PRIMEIROS SOCORROS, TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA E ANTÍDOTO PARA CADA FORMULAÇÃO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE;**
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Manter o produto na embalagem original;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Sulfonamida Fluoroalifática

Nome comum: Sulfluramida

Ação Tóxica: Hipersensibilidade, anemia

Antídoto/tratamento: Não há antídoto específico; Tratamento sintomático

Telefone de emergência: (14) 3417 6076

Telefone do centro de informações toxicológicas (CEATOX) : 0800 14 8110 (24 horas)